

陈忠高

江苏省如皋市水产技术指导站

226500

浅谈垂钓经营中的几个误区

随着人们日益增长的物质文化消费需求, 游钓业作为都市休闲渔业的主题越来越受到广大消费者的欢迎。同时, 它在渔业结构调整、渔业增效、渔(农)民增收中发挥了积极的作用。我市现有规模不等、功能各异的游钓场馆数十家, 纵观其十多年来的发展轨迹, 剖析其中十多家兴衰, 笔者认为部分业主在游钓经营中存在以下几个误区:

误区1. 认为: 卖钓收入 = 卖钓量 × (卖钓价 - 采购价)。有的游钓业主看到垂钓卖钓价比普通鱼市价每公斤高出4元~6元, 甚至更高, 认为有利可图, 于是租一口3亩~5亩的鱼塘, 不考虑其池塘的水源等条件, 从异地买来数吨鱼放进鱼塘, 就办起了游钓场。结果是事与愿违, 非但没能赚钱, 反而徒劳一场, 甚至亏损。原因有四:

一是没有考虑异地购鱼的运输风险及正常的运输途耗;

二是没考虑到鱼入池后的环境影响, 特别是水质恶化鱼不进食而引起的鱼体自耗;

三是没考虑到卖钓返本周期;

四是没有考虑到异地鱼入池后的“服池”管理成本。笔者经观察研究认为: ①异地购鱼运输风险很大。草

鱼、鳊鱼购回后返塘成活率很难保证, 即便能成活, 其成活率也很低。在1、2月份低密度运输(入市活鱼运输密度的50%)一般成活率只有60%~70%; 银鲫运输成活率相对较高, 掌握得好返塘成活率可达90%以上或更高, 但装运技术要求很高, 不同于普通进入市场的活鱼运输。而且在采购时对鱼类群体质量也有一定要求。主要是体质质量指标, 包括养殖环境、投喂的饲料种类、甚至种质纯度等。弄不好购回入池后也会引起大批量伤病死亡。主要是皮肤受伤, 皮下出血性感染致死, 损失惨重。②运输途耗必须计算。5小时运程以内装运, 途耗5%左右。③鱼体返塘后鱼体自耗较大。一般为鱼体重的5%~10%, 最高可达20%以上。其高低主要跟投放密度、水质、饲养管理水平、鱼类进食情况以及存塘时间等有关。入池体耗与密度成正比, 密度越高, 水质不良, 体耗增大; 与饲养管理水平成反比, 管理水平低, 鱼类进食少, 体耗增大; 与存塘时间成正比, 置留时间越长, 体耗越大。例: 1、2月份购进的异地银鲫生殖腺成熟度很高, 可谓大腹翩翩, 膘肥体胖。入池不久即进入春繁季节, 不少鱼“流产”, 不

产卵的鱼也自我吸收消耗。加之卖钓池投放密度相对都很高(一般都在1000kg/亩以上, 高的达2000kg/亩~3000kg/亩), 水质难以保证, 鱼类大多不进食(有的因为追求上钩率, 人为不投饵)。所以体耗很大, 一般都在10%左右。如若能在4、5月份及时出塘返本, 会产生一定效益。如差价6元/kg左右, 可赚2元/kg, 若上半年不出塘, 等到下半年, 那体耗最高可达20%以上, 则获利微微, 甚至亏本。

误区2. 养密度越大, 上钩率越高。不少游钓业主片面认为水中鱼类密度越大, 上钩率越高。其实这是误区。钓鱼上钩率与水中鱼的密度确实有很大关系, 而且在一定范围内是正相关关系。但绝不是密度越大, 上钩率越高。相反超过一定的密度, 由于水质恶化, 水体缺氧, 塘鱼缺氧无力, 根本不进食, 造成有鱼不上钩, 钓者扫兴, 玩者无味, 钓一次再也不返, 既卖不出鱼, 又失去顾客, 得不偿失。这种现象很普遍, 尤其是高密度游钓场, 一旦遇上阴雨等恶劣天气更甚。笔者认为游钓场放鱼密度应根据池塘环境、水质条件以及品种类型确定在1000kg/亩上下。并尽量及时补数, 保持平衡。

误区3. 卖钓塘不能投饵, 否则影响上钩率。这也是好多游钓经营者的误识。其实鱼是“无胃”的动物, 在自然条件下生活在水中鱼是连续不断摄食的, 很少有饱食的机会。在人工养殖条件下, 由于人为大量投饵方有饱食机会。但在卖钓场, 由于投放密度相对较高, 业主大都不投饵或很少投饵, 鱼类大部分时间处于饥饿状态, 故而上钩率的高低主要与水质特别是水中溶氧量有关, 跟是否投饵没有太大关系。相反, 如果长期不投饵, 鱼体一是体耗增加, 影响效益, 二是体能体质下降容易生病, 缺乏活力, 食欲不振而导致上钩率下降。所以卖钓者要坚持适量投喂, 根据塘存量定量投饵, 投喂量掌握在常规养殖投喂量的30%~40%左右, 让鱼始终处于半饥饿状态, 虽然不能增加体重, 但也不至于减少体重, 从而保持一个相对平衡状况, 从而提高群体卖钓量, 保障整体效益。

误区4. 唯鲫是钓。勿容置疑, 鲫鱼好运好养好钓, 所以卖钓人一般都有一个共识: 唯鲫是钓。因此绝大多数游钓场的主要品种是银鲫。其实这也是误识。殊不知, 钓者的心理是一品无味, 多者无趣。他们追求的是五花八门、多姿多彩的感觉和大自然的感受。品种要繁多, 规格要大小搭配。好的卖钓场应该是一品为主, 规格齐全, 品种繁杂。这样才能赢得更多的顾客和更好的卖场, 最终取得最佳的效益。

综上所述, 笔者认为, 游钓经营者要想达到预期效果, 必须走出上述四个误区, 科学论证, 慎重从业。切忌打如意算盘, 听取误论, 盲目投资。从事卖钓业, 一要建设集游钓、休闲、娱乐、特色餐饮于一体的功能齐全的休闲游钓场所; 二要认真学习掌握鱼类养殖基本技术, 科学确定放养计划, 品种、规格、密度要合理。有条件的增放少量名特水产品, 而且要加强饵肥管理, 尤其是水质管理; 三最好建设多功能水面钓鱼场, 搞好池塘功能的划分和配置, 自养自放, 保证卖钓水面的密度平衡, 避免和减少异地购鱼。

渭水河流域 秦岭细鳞鲑 背后的故事

杜
汉
斌

武
金
星

王
绿
洲

陕西省水产研究所

710068

有关文献中曾提到秦岭南麓的秦岭细鳞鲑可能是人为引进的。2004年3月, 笔者在周至县老县城村意外地得悉一些关于引进细鳞鲑的线索, 随即走访了当地几位年长者, 了解到当年将细鳞鲑从黑河(渭河支流)运至渭水河(汉水支流)的当事人(背鱼人)的有关信息。于2006年10月访问了目前唯一健在的这位当事人。

一、从黑河向渭水河引进细鳞鲑的过程

据当事人宋时舜谈: 大约在民国27年或28年五、六月间(1938年或1939年), 他与宋孝都、吕宝恒三人用漆桶将细鳞鲑从黑河支流鱼肚河中捞出, 经松盘沟运至老县城附近的渭水河中(见图1)。当时宋家住在老县城村(当时为佛坪县原县城驻地)。据宋谈, 为躲避土匪骚扰, 他家在松盘沟中建有垒木房(简易房屋), 同时在松盘沟中有耕地, 时常到松盘沟去。宋孝都、吕宝恒虽是其叔辈, 但三人年龄相仿, 平时同在私塾读书。背鱼时他大约十五六岁, 他们是先将鱼苗从鱼肚河中捞起, 放入松盘沟屋旁的小水池(当地农户人畜饮用水渗水坑)中, 集中后一次将鱼装入一漆桶中, 经松盘沟背到渭水河边,